



Туберкулез

Туберкулез - инфекционное заболевание, которое вызывается микобактерией туберкулеза и чаще поражает легкие.

Заболеть туберкулезом может каждый

Болезнь может передаваться от больного человека к здоровому при кашле, чихании и разговоре.

Если у Вас или Ваших близких появились такие признаки, как:

- КАШЕЛЬ БОЛЕЕ ДВУХ НЕДЕЛЬ
- ночная потливость
- повышение температуры тела
- отсутствие аппетита
- потеря веса
- слабость и утомляемость



необходимо обратиться к медицинскому работнику в ЦСМ/ГСВ/ФАП по месту проживания.

Для исключения туберкулеза легких необходимо:

- получить консультацию медицинского работника
- пройти исследование мокроты в ЦСМ, ГСВ/ФАП
- сделать рентген органов грудной клетки

При подтверждении диагноза «туберкулез» больному необходимо принимать противотуберкулезные лекарства непрерывно, комплексно, до полного окончания курса лечения и обязательно под наблюдением медицинского работника.

Лечение туберкулеза длится не менее 6 месяцев

Перерывы в лечении или самостоятельное прекращение лечения приводят к развитию более тяжелой лекарственно-устойчивой формы туберкулеза (ЛУ-ТБ), лечить которую сложнее и длительнее.

Стационарное или амбулаторное лечение определит врач совместно с пациентом. Внедрение амбулаторного лечения туберкулеза позволяет больному вести привычный образ жизни, находиться в обществе и снижает риск внутрибольничного заражения более тяжелыми формами туберкулеза.

Туберкулез излечим!

Данная публикация стала возможной благодаря помощи американского народа, оказанной через Агентство США по международному развитию (USAID). Мнения авторов, выраженные в данной публикации, не обязательно отражают позицию USAID или Правительства США.



Утверждено Экспертным советом Минздрава КР 10.03.2017 года
Бумага 90 гр. Формат: 64x90, 1/4. Тираж: 350 000 экз.
Отпечатано в ОсОО «Лэйбл». Адрес: г. Бишкек, ул. Орозбекова 44.





Кургак учук

Кургак учук - кургак учуктун микобактериясынан пайда болгон, көп учурда өпкөнү жабыркатуучу жугуштуу оору.

Ар бир адам кургак учук менен ооруп калышы мүмкүн

Оору бейтап адамдан дени сак адамга жөтөлүү, чүчкүрүү жана сүйлөшүү аркылуу жугушу ыктымал.

Эгерде Сизде же Сиздин жакындарыңызда төмөндөгүдөй белгилер:

- 2 ЖУМАДАН АШЫК ЖӨТӨЛҮҮ
- түнкүсүн тердөө
- дене табынын жогорулашы
- табиттин жоголушу
- салмактын азайышы
- алсыздык, чарчоо



пайда болсо жашаган жери боюнча ҮДБ/ҮДТ/ФАПтагы медициналык кызматкерге кайрылуу зарыл.

Өпкөнүн кургак учугун жокко чыгаруу үчүн:

- медицина кызматкеринин кеңешин алуу
- ҮМБ, ҮДТ/ФАПка какырыкты изилдөөгө тапшыруу
- көкүрөк клеткасынын органдарын рентгенден өткөрүү зарыл

“Кургак учук” дарты тастыкталган учурда оорулуу кургак учукка каршы дары каражаттарын дарылоо курсу толук аяктаганга чейин медициналык кызматкердин көзөмөлү менен үзгүлтүксүз, комплекстүү ичүүсү керек.

Кургак учукту дарылоо 6 айдан кем эмес убакытка созулат

Дарыланууну үзгүлтүккө учуратуу же дарыланууну өз алдынча токтотуп коюу, дарыланышы татаал жана узакка созула турган (2 жылга чейин) кургак учуктун дарыга-туруктуу (КУ-ДТ) оор түрүнүн өнүгүшүнө алып келет.

Стационардык же амбулатордук дарылоону дарыгер бейтап менен биргеликте дайындайт. Кургак учукту амбулатордук дарылоо бейтапка көнүмүш жашоосун улантууга, коомчулукта болууга мүмкүнчүлүк берет жана оорукана ичиндеги кургак учуктун оор түрлөрүнүн жугуу коркунучун азайтат.

Кургак учук айыгат!

Бул басылма Америка Кошмо Штаттарынын эл аралык өнүктүрүү боюнча агенттиги (USAID) аркылуу Америка элинин жардамы менен ишке ашырылды. Авторлордун ушул басылмада айтылган пикирлери USAID же АКШ өкмөтүнүн позициясын чагылдырбайт.



USAID
АМЕРИКАНЫН ЭЛИНЕН



КРнын Саламаттык сактоо министрлигинин Эксперттик кеңеши тарабынан
2017-жылдын 10-мартында бекитилди
90 гр. кагаз. Форматы: 64x90, 1/4. Нускасы: 350 000 даана.
«Лэйбл» ЖЧК басмаканасы. Дареги: Бишкек ш., Орозбекова көч. 44.

